

莲城又到“飞絮季”，飞絮缘何年年飘？

市区部分路段的杨树注射了“抑花一号”杨柳飞絮抑制剂，飞絮量减少了90%以上

本报讯（记者 张汉杰 文/图）又到了杨絮、柳絮漫天飞舞的季节，不少人纳闷，飞絮缘何年年飘？记者了解到，从2014年起，我市有关部门对城区内的14360株杨树、柳树进行了注药防控治理，有计划地调整了树种结构。2018年春天，城区杨柳飞絮整体减少70%至80%，但仍残留20%的飞絮。

“飞絮季”，部分路段飞絮量减少90%以上

4月3日上午，在市区八一路西段，这里的杨树已经开始飘飞絮。一辆洒水车正在附近进行洒水作业，确保路面潮湿，防止落地的飞絮再次飘到空中。

记者沿路观察了一下，发现不少杨树虽然产生了杨絮，但量并不大。“已经飘几天啦！今年的效果感觉还不错，飞絮明显比往年少了许多。”提起这里的飞絮，负责这一路段的保洁员华爱霞说，她在这个路段做保洁已经5年有余，每年这个时候最让她头疼的就是这些飞絮。“杨树飞絮飘得到处都是，只能等风稍微小一些才能勉强清扫一部分，给行人带来了诸多不便。”

“我们注射了‘抑花一号’杨柳飞絮抑制剂，从源头进行了治理，有效地控制飞絮产生。”市园林绿化管理处技术指导科科长毕丽华说，八一路西段栽种的杨树属于毛白杨，枝干挺拔粗壮，生态效益好，而且不易生病，吸收污染气体、防治微生物的效果也好。不过，它的缺点是春天会产生飞絮。“每棵杨树的胸径不同，需要的药也不同，用药适中的话能起到很好的抑制效果。延安

路等路段，今年的飞絮量减少了90%以上。”

今年治理飞絮，采用雾炮车喷洒杨柳凝絮剂

据毕丽华介绍，目前我市产生飞絮的树木有毛白杨、柳树和速生杨。3月下旬至4月上旬，毛白杨产生飞絮。4月中旬至下旬，柳树产生飞絮。4月下旬至5月上旬，速生杨产生飞絮。飞絮飞舞的时间将持续一个多月。

既然飞絮影响环境和市民的生活，为何不把它们替换成其他树种？“我们认真考虑过这个问题！”毕丽华解释，由于市区杨树、柳树数量较多，若大量更换会破坏已有的绿化成果，短期内难以恢复。而且，砍伐树木需要投入较大的人力、物力和财力。

据毕丽华介绍，为解决杨柳飞絮问题，2014年，他们尝试对市区建安大道、毓秀路、新兴路、望田路4条道路的柳树进行了试验性防控。经调查，柳树飞絮整体减少70%至80%。随后几年，市园林绿化管理处和东城区、魏都区、国家许昌经济技术开发区对管辖的共计14360株杨柳树进行了全面注药防控。2018年春天，城区杨柳飞絮整体减少70%至80%，效果良好。

“当年使用药物，可以控制次年的飞絮。”毕丽华说，飞絮结束之后，他们将继续对管辖内的杨树、柳树注射飞絮抑制剂，进一步加强杨柳飞絮的防控治理。除此之外，在今年春季飞絮高发期，我市相关部门将采用雾炮车对杨树、柳树喷洒杨柳凝絮剂，粘固飞絮；每



市区百花北路与学府街交会处附近的杨树开始飘飞絮，给市民生活带来不便。

3天高压冲洗一次树冠；增加日常保洁频次，及时清除地面、空中的飞絮。

飞絮飞舞，谨防过敏

杨柳飞絮不仅影响自然环境，还容易引发人体呼吸道感染和皮肤过敏等。据了解，飞絮也是一种重要的过敏源，被吸入鼻腔后，会引起流涕、咳嗽和哮喘等反应，也会出现皮肤瘙痒、眼结膜发红等症状。

市中医院医生徐征华建议，杨柳飞絮高发时期，过敏体质人群应尽量减少外出次数，如果必须外出，尽量做好防范措施，如戴口罩、眼镜和围巾，还可以着长袖衣服加以防护。回家前注意把身上的飞絮残留物清理干净，回家后清洁面部以避免产生过敏反应。易过敏人群可遵医嘱口服抗过敏药物。如果一定要外出，可选择在上午10时前或下午4时后飞絮相对不活跃的时段出门。

瑞士迅达控股企业  **XJ Schindler**

西继迅达电梯加装热线
400 811 6869

您身边的
旧楼加装电梯专家

为您提供全面加装预案

