

许昌开封两地 市场监管部门协手合作

签订跨区域“双随机、一公开”监管战略合作协议

本报讯(记者 张刚 通讯员 孙丽敏 文/图)近日,许昌市市场监管局经济技术开发区分局与开封市市场监管局祥符区分局签订跨区域“双随机、一公开”监管战略合作协议(如图),开创了我市跨区域联合监管的先河,为两地市场监管领域协同监管、联合抽查、异地互查、结果互认翻开了新篇章。

据悉,根据战略合作协议,双方约定以联合抽查检查、跨区域互查、邀请相关单位到本区域开展多部门联合查等方式,建立跨区域协同监管机制,针对食品药品、特种设备、知识产权保护等涉及群众生命安全、案件多发领域实施协同监管。随机抽取市场主体、随机匹配两地执法人员开展抽查,检查结果及时通过国家企业信用信息公示系统向社会公示,实施联合惩戒。

许昌市市场监管局经济技术开发区分局相关负责人表示,此次战略合作



协议的签订,有力推动了跨区域行政执法联动响应和协作机制的建立,有利于实现监管效能最大化和对市场主体干

扰最小化,为进一步增强市场主体经济活力、优化营商环境、促进两区经济高质量发展打下坚实基础。

许昌市市场监管局
魏都区分局
开展食品生产企业
及小作坊专项检查

本报讯(记者 张刚 通讯员 赵娅丽)夏季到来,气温升高,食品加工领域风险系数增高。为进一步加强食品安全监管,全面排查食品生产经营风险隐患,规范食品生产经营秩序,近日,许昌市市场监管局魏都区分局深入开展食品生产企业及小作坊专项检查。

制定活动方案,强化引导。结合辖区食品加工小作坊的生产情况,印发了《关于开展食品生产企业及小作坊食品安全隐患专项整治活动》的通知。活动分为自查阶段和验收阶段,要求各食品生产企业及小作坊严格按照食品生产监督检查要点表进行自查自纠,规定自查阶段、验收阶段时限,同时在通知中附带了食品生产企业监督检查要点表详细内容。

严格执法验收,强化监管。该局组织执法人员按照检查要点表的内容,重点对食品生产企业及小作坊是否持照亮证生产,加工场所卫生条件是否符合生产加工要求,是否制、售分离,设备设施等是否符合卫生规范要求,使用的原料、添加剂是否建立并严格执行进货查验、索证索票、购销台账等制度,食品包装标识是否符合规定等情况进行详细检查。针对检查中发现的进货查验制度执行不到位、生产加工场所卫生不符合要求、工作人员未佩戴衣帽、“三防”设施不到位、食品安全知识培训少等问题,执法人员现场给予指导并要求限期整改,下达责令改正通知书。

该局相关负责人表示,下一步,该局将及时采取“回头看”等措施,对问题突出的食品生产企业及小作坊从快从严进行查处。以创建国家食品安全示范城市为契机,督促各类市场主体定期开展自查,压实主体责任,严厉打击违法违规行为,切实做好食品安全监管工作,保障群众“舌尖上的安全”。

捐献血液 分享生命

6月14日上午,庆祝“6·14”世界献血者日骑行宣传活动在许昌市中心血站拉开序幕。我市百次献血志愿者、许昌科技学校青年志愿者及许昌市中心血站干部职工共计40多人,来到街头、广场等地,积极宣传无偿献血。据统计,当天,我市共有278名爱心群众参与献血,累计献血量为10.84万毫升。

记者 刘地委 摄



男子患包虫病肚大如孕妇,医生妙手除疾

□ 本报记者 张炜华 文/图

近日,39岁的陈先生到许昌市人民医院复查时,肚子已经变回正常大小,排尿也恢复了正常。他激动地对该院普外二科主任郭德洋说:“感谢您治好了我的包虫病!”

原来,一个月前,陈先生因下腹部胀痛到许昌市人民医院就诊。因查出“膀胱后见一混合回声巨大肿物”,被怀疑是肿瘤,陈先生来到该院普外二科住院治疗。住院后,陈先生完善盆腔CT,查出盆腔占位性病变。

“他来医院的时候,肚子像怀孕七八个月的孕妇。”6月17日,郭德洋告诉记者,患者大便次数和性状没有明显改变、膀胱无尿血,不符合肠道、泌尿系统肿瘤的特征。在询问病史时,患者自述未到过畜牧区等包虫病多发地旅居,因此,医生判断患者患包虫病的可能性不大。

“当时,我们也想过利用穿刺确认囊肿内容物,但考虑到万一是包虫病,一旦囊壁被破坏,囊液里的棘球蚴就会给胸腔和腹腔带来感染。”郭德洋说,但是,无论是肿瘤、囊性病变还是包虫病,在不能确诊时,外科手术是必要的,可以达到确诊和治疗的双重目的。

因为患者囊肿过大,医生选择了开



查房

腹。患者囊肿包膜厚,且与腹腔粘连严重,特别是接近盆底时,粘连更加严重,需要手术医生一点儿一点儿剥离,手术过程并不轻松。越靠近盆底,盆腔组织被挤压得越厉害,手术空间越小,手术进

行得越困难。最终,在做好防护措施的前提下,手术医生将患者囊肿内容物吸出一大部分,手术得以顺利进行。

“内容物被吸出来的时候,我们就已经能确定患者患的是包虫病了。”郭德洋

说,吸出来的囊液里,有很多肉眼可见的棘球蚴。后来经过病理检验,证实患者的确是患的包虫病。

郭德洋介绍,包虫病是人体感染棘球绦虫幼虫(棘球蚴)所致的寄生虫病,因此又被称为棘球蚴病。目前,最有效的治疗方法就是外科手术。

包虫病主要通过食用被虫卵污染的食物和水等经消化道感染,常累及患者的肝、肺、脑等组织器官,是一种人兽共患寄生虫病,多见于畜牧区,患者大多与狗、羊等有密切接触史。

“包虫病具有较长的潜伏期,一般为一二十年,或者更长时间。”郭德洋介绍,棘球蚴可以在犬科的小肠内长期生存,因此,家里养有狗等宠物的,或者从事畜牧业的人,一定要注意卫生:动物的粪便要及时清理,清理后要及时洗手;要注意动物的饮食卫生;与动物接触后,要及时洗手或清洁全身。

医界前沿
许昌市人民医院协办