

规范药店经营行为 保障群众用药安全

□本报记者 马晓非
通讯员 杜丽鹏

4月16日上午,许昌市“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月活动
在市区科技广场正式启动。此次活动
是根据国家医疗保障局的工作部署而
开展的,旨在广泛宣传基金监管政策
法规、畅通各级医保部门举报投诉渠
道、明确举报奖励办法、曝光骗保典
型案例等,发动一场打击欺诈骗保的
“人民战争”,在全社会营造“不敢
骗、不想骗”的良好氛围。

在打击欺诈骗保的高压态势下,
零售药店成为重点监管对象之一。在
生活中,用医保卡购买药品,然后销售
给非法回收人,再回流到药店或诊所
的骗保案件并不罕见,全国各地都曾
发生。通过这种渠道销售给人们的药
品又被称为“回流药”。2018年,宁
波50多名老年人用医保卡买药,然后
把药倒卖给药贩子赚取差价,最终全

被判刑的消息引发广泛关注。

“回流药脱离了药品储存必要的温
度、湿度,药品质量难以保证,甚至可
能被非法回收人在回收再销售的过程
中掺杂假药,给群众的用药安全带来
隐患。”4月17日,步长制药股份有
限公司许昌办事处经理赵东树对记者
说。

零售药店的规范化管理是市场监
管部门日常监管工作的重点之一。为
进一步规范全市药店的经营行为,保
障人民群众的购药、用药安全,许昌市
市场监管局开展了药品零售企业“双
随机”检查、处方药销售专项检查行
动和药品零售企业执业药师“挂证”
行为整治行动,探索构建药品流通全
程追溯系统。

“坚持以发现问题为导向,针对药
品流通领域存在的突出问题,我们在
做好日常监管及GSP认证、跟踪检查
的基础上,充分发挥专项检查和‘双随
机’检查的作用,消除风险隐患。”4
月17日,许昌市市场监管局药品流
通科负责人陈汇强告诉记者。

依照《药品经营质量管理规范》等
法律法规要求,许昌市市场监管局工
作人员从证照管理、购进验收、储存
养护、销售管理等方面对药品零售企
业进行全面检查,检查药品是否规范
摆放、进货渠道是否合法、购进药
品时索证索票是否齐全、是否建立
完整的药品购进验收记录等。

在处方药销售专项整治行动中,许
昌市市场监管局严查处方药的规范
销售情况,如是否分柜摆放处方药与
非处方药、是否有处方药开架销售现
象、是否凭医师处方销售处方药,以
及有无以搭售、买药品赠药品、买
商品赠药品等方式向公众赠送处方
药等。针对检查中发现的问题,许昌
市市场监管局工作人员进行现场指
导,并下达整改通知书。

在检查的过程中,许昌市市场监
管局工作人员非常注重对药品零售企
业负责人进行药品法律法规宣传,切
实转变药品零售企业负责人的观念,
督促药品零售企业落实好企业主体
责任,明确企业是用药质量安全第一
责任人,督促其

增强质量安全主体责任意识,规范药
品零售企业的经营管理和服务行为。

在市场监管部门加大监管力度的
同时,药品生产企业也采取了一系列
措施。

步长脑心通胶囊、步长稳心颗粒
一直深受患者信赖。为了让患者能
够买到放心药,步长制药股份有限公司
许昌办事处在我市零售药店开展了
销售授权活动,为那些从正规渠道进
货的零售药店挂上“步长制药授权经
销店”的牌子。

“目前,我们已经为市区30多家
零售药店授牌,每家零售药店的授
权牌都有编号,可以在网上查询真
伪。请群众一定到这些有授权的药
店买步长制药的药品,能保障买到真
品、正品。”赵东树对记者说。

药品安全监管永远在路上。在各
部门的共同努力下,群众的用药安全
必将得到充分保障。

省内外“大咖”齐聚 推动胃肠外科发展 与会人员戴3D眼镜观看手术直播

本报讯(记者 马晓非)4月13日,
河南省人民医院胃肠外科主任张超走
进许昌市中心医院手术室,采用3D
腹腔镜技术做了一台直肠癌手术和一
台胃癌手术。与此同时,在许昌市中
心医院急诊楼8楼会议室,近200名
与会人员戴着3D眼镜,通过大屏幕
清晰地观看了手术直播。

“3D腹腔镜技术效果更加立体、
直观,有种身临其境做手术的感觉。”
观看完手术直播后,许昌市中心医院
胃肠外科主任菅书明对记者说。3D
手术演示让与会人员耳目一新,也使
大家受益匪浅。

当天,由河南省医学会、河南省人

民医院主办、许昌市中心医院承办的
“医带豫路——肠胃微创2019豫见
你·许昌站”活动在许昌市中心医院
开展,省内外知名胃肠外科专家为
我市医护人员授课,开展手术难点讨
论,进行3D手术演示,推动我市胃
肠外科诊疗水平进一步提升。其中,
3D手术演示环节在与会人员中引起
了强烈反响。

目前,3D腹腔镜技术正逐渐应
用于临床。3D腹腔镜技术是在普通
腹腔镜技术的基础上发展而来的,医
生必须佩戴3D眼镜进行手术操作。
该技术具有全高清的立体感和空间
感,不容易损伤人体的正常组织,使
手术更微创、更精细、更安全。

据了解,“医带豫路——肠胃微创
2019豫见你”活动由张超联合省
内外知名专家发起,主要通过学术讲
座、3D手术演示、学术交流与讨论
等方式,为各地市带去先进的胃肠疾
病诊疗新技术,普及并规范肠胃微
创手术的开展,解决各地市级医院在
胃肠微创技术发展中的难题,促进优
质医疗资源下沉,提升全省各地市
级医院的医疗服务能力。

活动当天,四川省人民医院胃肠
外科主任王康华、中科大同济医
学院附属同济医院胃肠外科主任曹
志新及张超、菅书明等作了精彩的
学术报告。



自许昌市国家卫生城市巩固提升工作推进会召开以来,全市卫生健康系统积极行动,认真做好国家卫生城市复审迎检工作。图为4月17日,许昌市妇幼保健院组织志愿者到社区开展卫生大扫除活动。马晓非 摄

坚持规范治疗 大部分结核病患者可治愈

□本报记者 马晓非

结核病又称痨病,是一种古老的
传染病,历史上对人类造成了非常
严重的危害,有“十痨九死”之说。
然而,随着医学的发展,有效药物不
断出现,结核病是可以治愈的,“十
痨九死”的说法早已成为历史。

“只要坚持规律服药并完成全部
疗程的治疗,大部分结核病患者都
可以治愈。而且在接受治疗2周后,
痰内结核杆菌会迅速减少,其活力
也会受到抑制或完全消失,对周围
人群没有传染性。”4月15日,许
昌市结核病防治所副所长田生盛对
记者说,“治愈后,结核病患者可
以正常工作、生活及学习。”

作为一种由结核杆菌引起的慢性

传染病,结核病可以发生在身体的
大部分器官,最常见的发生部位是
肺部,称为肺结核。在没有上呼吸
道感染的情况下,如果连续咳嗽、
咳痰两周以上或痰中带血丝,就要
警惕是否患了结核病,应及时到结
核病防治专业机构进行检查。经过
检查,如果被诊断出患有结核病,
要按照医嘱,在医生的指导下完
成治疗。患者在治疗过程中若有
不适,应及时告诉医生,并按时复
查。

结核病患者如果能够坚持服药6
到8个月,一般情况下可实现治愈。
如果不坚持规律服药,可能发展为
耐药结核病,很难再完全治愈。与
普通结核病相比,耐药结核病诊断
复杂、治疗困难、疗程较长,给患
者带来的经济负担也比较重。

普通结核病患者治疗一般需要6

到8个月,耐药结核病患者至少需
要24个月,且容易出现并发症,治
愈率较低。另外,因需要长时间服
用二线药物或更高级的药物控制病
情,耐药结核病患者治疗费用要比
普通结核病患者高得多。

“坚持规范治疗对防控结核病至
关重要。在治疗过程中,结核病患
者要坚持按时、足量、规律、多药
联合和全程治疗等原则,中途不可
擅自减药或停药,否则可能产生耐
药菌,从而发展为耐药结核病。”田
生盛提醒。


得了结核病,应注意休息,不要
过于疲劳。由于结核病是一种消耗
性的疾病,因此患者应多吃一些富
含蛋白质等营养丰富的食品,如牛
奶、肉类和豆制品等,还要多吃蔬
菜和水果以补充维生素;同时,应
不吃或少吃辛辣食

物,如葱、洋葱、辣椒、胡椒等。

有些人知道自己得了结核病,就
非常悲观,把自己隔离起来,不与
他人在一个桌子上吃饭。其实,结
核病主要通过呼吸道传播,与他人
一起吃饭并不会导致传染。

一些年轻的结核病患者常常担
心得病后会影响到求学、就业、
恋爱、婚姻及生育等。田生盛告
诉记者,结核病虽然是一种传染
病,但不是遗传性疾病。患了结
核病的年轻人应首先集中精力把
病治好,如果已经有了恋爱对象,
则应把病情如实告诉对方,不要
在病情没有稳定时就匆匆结婚,
以免影响婚后夫妻生活、优生优
育等。同时,抗结核药对胎儿有
不利影响,患有结核病的孕妇服
用抗结核药物,容易造成胎儿畸
形。

许昌市人民医院 成为301环骨盆微创救治 联盟理事单位



石新成(左)向患者耐心讲解病情

本报讯(记者 马晓非 文/图)3月
22日,北京医学奖励基金会——
301环骨盆微创救治联盟成立大
会在北京召开,许昌市人民医院成
为301环骨盆微创救治联盟理事
单位,该院骨科一病区主任石新成
被聘为301环骨盆微创救治联盟
骨科专家理事。此外,该院还顺利
成为河南省骨盆及多发伤救治盟
员单位。

“成为301环骨盆微创救治联盟
理事单位,标志着我院在骨盆微创
救治方面迈上了一个新台阶。”石
新成对记者说,“我们不仅可以与
北京301医院的专家进行远程会
诊,还可以邀请专家到我院开展手
术,方便患者就医。”

据了解,301环骨盆微创救治盟
由中国人民解放军总医院(北京301
医院)牵头成立,主要是为了贯彻
落实《“健康中国2030”规划纲要》
《国务院办公厅关于推进医疗联合
体建设和发展的指导意见》《国家
卫生健康委员会关于开展医疗联合
体建设试点工作的指导意见》等文
件精神,探索有中国特色的专科盟
员发展模式,促进不同区域、医疗
机构间技术资源互补。该联盟着
眼于环骨盆微创技术的推广应用,
致力于推动环骨盆微创技术的规
范化发展,搭建疾病数据平台和学
术交流平台,提升基层医院的医疗
救治水平,更好地服务群众健康。

骨盆的解剖结构特殊而复杂,周
围有重要血管、神经和内脏器官,
复杂骨盆骨折的致死率为25%到
39%,致残率

医界前沿 许昌市人民医院医疗新科技成果巡礼

狂犬病致死率接近100% 被动物咬伤应及时接种疫苗

□本报记者 马晓非
通讯员 毛树存

狗是人类忠诚的朋友,导盲犬、
缉毒犬、搜救犬是人们工作中的
重要帮手,宠物犬给人们的生活带
来了快乐。然而,狗也可能在不
经意间传播传染病,如棘球蚴病、
黑热病、狂犬病等。其中最严重
的便是狂犬病,一旦发病,致死
率接近100%。

狂犬病究竟是一种什么样的病?
生活中该如何防治狂犬病?4月17
日,记者对许昌市疾病预防控制中心
健康教育科科长唐丽红进行了采
访。

“狂犬病又名恐水症,是由狂犬
病毒所引起的人兽共患急性传染
病。”唐丽红对记者说,“所有的
哺乳动物都有感染狂犬病的风险,
但是因人的狂犬病95%是由狗传
来的,所以称之为狂犬病。除了狗
之外,猫、狐狸、狼、蝙蝠、鼬
獾等也可以传播狂犬病。”

狂犬病毒通常由发病的狗、猫等
动物,通过咬伤或抓伤人体把病毒
传染给人。发病的动物舔舐人的口
腔、会阴、肛门及尚未愈合的伤
口等,也会传播病毒。少数人可能
会在宰杀发病的动物或对发病的
动物进行剥皮、切割等过程中感
染病毒。

从感染狂犬病到出现症状的时间
一般为1到3个月,1年以上的比
较罕见。狂犬病的典型症状分为
狂躁型和麻痹型,但大部分患者
都是狂躁型,主要表现为高度兴
奋、恐水、怕风、阵发性咽肌
痉挛等,也可能表现为流涎、吐
沫、多汗、心率加快、血压升
高等。麻痹型患者以四肢无力、
麻痹为常见症状,有时候会被诊
断为病毒性脑炎。狂犬病的非典
型症状表现为低烧、乏力、全身
不适等,一般持续2到10天。

“目前,没有治疗狂犬病的有效
手段,一旦发病,几乎100%的患
者都会死

亡。因此,做好狂犬病的预防至
关重要。”唐丽红提醒。生活中,
应避免接触野生動物、流浪动
物,不要挑逗或玩弄狗、猫等动
物,不要让动物舔舐自己皮肤的
伤口。

一旦被狗、猫等动物咬伤或抓
伤,过度惊慌或过度自信都是不
可取的,应尽快接受规范的暴露
处置。一般来讲,规范的暴露处
置流程有三部分:一是进行伤口
处理,二是进行疫苗接种,三是
注射免疫球蛋白。

“被动物咬伤后,应尽快用流动
的清水和肥皂水(或其他弱碱性
清洁剂)交替清洗伤口15分钟左
右,然后用生理盐水冲洗伤口。自
行清洗伤口后,尽快去专业机构
进行伤口处理。”唐丽红建议。

除非接触猫、狗的皮肤没有任何
伤口,或没有被接触到黏膜,否则
都需要接种狂犬疫苗。狂犬疫苗
并非只打一针,而是要通过1个
月左右才能完成免疫,一定要严
格按照时间规律接种,不可中
断。目前,狂犬疫苗的接种方式
有“5针法”和“4针法”两种。
孕妇、哺乳期女性、儿童、老
年人等都可以接种疫苗。免疫球
蛋白的注射依具体情况而定,并
非所有人都需要注射。

“虽然狂犬病的致死率几乎为
100%,但经过及时、规范的暴
露处置,能收到非常好的预防效
果。”唐丽红说,“进行暴露处
置的机构为狂犬病暴露处置门
诊,一般设置在医院急诊、预防
接种门诊或疾病预防控制中心。”

